

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP -1-6-66 510837

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE : 24 numéros par an

ÉDITION DE LA STATION DE STRASBOURG

Tél. 34-14-63 - Poste 93

(BAS-RHIN, HAUT-RHIN, MEURTHE-ET-MOSELLE, MOSELLE, VOSGES)

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux : Cité Administrative, 2, Rue de l'Hôpital Militaire

67 STRASBOURG

C. C. P. : STRASBOURG 55-08-86

ABONNEMENT ANNUEL

15 F.

27 Mai 1966

Supplément n° 4, du Bulletin du mois de Mai 1965

Avertissement

ARBRES FRUITIERS

TAVELURES DU POMMIER ET DU POIRIER

Dans les vergers insuffisamment protégés au cours des dernières semaines, les manifestations de Tavelures sont relativement nombreuses (plus spécialement sur les variétés sensibles à cette maladie).

La période des risques de contaminations par les ascospores n'est pas terminée et des projections peuvent encore se produire à chaque précipitation. Par ailleurs, dans les vergers mal soignés, la maladie est susceptible de progresser à partir des conidies formées sur les taches existantes.

Dans le but d'assurer une protection aussi parfaite que possible en cette période de grossissement rapide des fruits, il est indispensable de maintenir une protection efficace. Un nouveau traitement devra être réalisé avant le 2 Juin.

Information

OIDIUM

Ajouter un anti-Oïdium. Poursuivre l'élimination des pousses oïdiées.

MOUCHE DE LA CERISE

Compte tenu des émergences notées depuis quelques jours dans notre station d'élevage, il est à prévoir une attaque imminente de Mouche de la cerise. Un traitement est à réaliser dans les conditions suivantes :

Sur les variétés tardives :

En traitement préventif. Opérer dès réception de la présente note en utilisant un produit à base de D.D.T. (125 gr. de matière active à l'hectolitre).

En traitement curatif. Intervenir à partir du 4 Juin. A l'exception du Diméthoate et du Formothion, utilisables jusqu'à 7 jours avant la récolte et le Phosphamidon et l'Endothion jusqu'à 21 jours, les autres produits cités sur la liste en votre possession sont utilisables jusqu'à 15 jours avant la récolte. Le Diazinon peut également être utilisé à la dose de 30 gr. de matière active par hectolitre.

.../...

308

Sur les arbres situés en altitude (au-dessus de 300 m) ce traitement pourra être différé de 8 jours.

Information

PETITS FRUITS

FRAISIERS

Des panachures sur feuilles sont observées actuellement dans de nombreuses cultures de fraisiers de la variété "Madame Moutot". Cette affection appelée plus fréquemment "panachures printanières" est d'ordre génétique et ne peut faire l'objet d'une lutte antiparasitaire. Il est conseillé de planter des plants sains et de donner sa préférence à une autre variété.

Avertissement

GRANDES CULTURES

POMMES DE TERRE

MILDIU DE LA POMME DE TERRE

Cultures de primeurs : Région de la HARDT (Ht-Rhin)

Les conditions actuelles sont favorables aux premières contaminations. Les cultures de primeurs, notamment celles situées dans les zones irriguées, sont les plus exposées.

Un premier traitement devrait être appliqué avant le 1er Juin. Pour le choix du produit, consulter la liste en votre possession.

BETTERAVES

PEGOMYIE

L'activité réduite de ce ravageur ne justifie pas d'intervention insecticide dans les plantations, tout au moins pour le moment.

HOUBLON

MILDIU

De nouvelles pousses spiciformes ont fait leur apparition au cours des derniers jours, augmentant sensiblement les risques de contamination.

Afin de prévenir toute extension possible de la maladie en cette période de temps perturbé, il est recommandé d'effectuer un nouveau traitement fongicide soigné. On opérera dès réception du présent avis

L'enlèvement et la destruction des pousses malades doivent être poursuivis avec soin.

Les Contrôleurs chargés des
Avertissements Agricoles :
J. BERNARD et C. GACHON.

L'Inspecteur de la
Protection des Végétaux
J. HARRANGER.

Imprimerie de la Station de STRASBOURG / Directeur-Gérant : L. BOUYX.